

Medicamentos que debe dejar de tomar antes de la cirugía

Esta es una lista de medicamentos que tienen un efecto sobre el proceso de coagulación de la sangre. Estos medicamentos deben evitarse entre 5 y 14 días antes de la cirugía.

Comuníquese con el médico que se los recetó para recibir instrucciones sobre cómo suspenderlos.

Los suplementos herbales (incluido el té) y las vitaminas también deben suspenderse 14 días antes de la cirugía, ya que algunos de ellos contienen anticoagulantes naturales.

Para los dolores de cabeza y de otra índole, PUEDE tomar Tylenol, de acuerdo con las instrucciones del envase.

Cilostazol - Pletal	Ketoloraco - Toradol
Dabigatrán - Pradaxa	Meloxicam
Diclofenaco - Arthrotec, Voltaren	Nabumetona - Relafen
Diflunisal - Dolobid	Naproxeno - Aleve, Anaprox, Naprosyn
Dipiridamol - Aggrenox	Oxaprozina - Daypro
Etodolaco - Lodine	Pentoxifilina - Trental
Aceite de pescado	Piroxicam - Feldene
Fondaparinux - Arixtra	SOMA compuesto
Ibuprofeno: Advil, Motrin, Midol	Sulindaco - Clinoril
Indometacina - Indocin	Vitamina E
Ketoprofeno - Orudis	

Si actualmente toma un anticoagulante (p. ej., Coumadin, Xarelto, Eliquis, Plavix, aspirina) según lo indicado por su médico de atención primaria, cardiólogo o hematólogo, comuníquese con ellos para recibir instrucciones sobre cómo suspender estos medicamentos antes de la cirugía. NO DEJE DE TOMAR ESTOS MEDICAMENTOS POR SU PROPIA CUENTA.